

Pregúntate

- ¿Te sientes triste o deprimida/o?
- ¿Te sientes más irritable o enfadada/o con los que te rodean?
- ¿Tienes dificultades para establecer un vínculo afectivo con tu bebé?
- ¿Sientes ansiedad o pánico?
- ¿Tienes problemas para comer o para dormir?
- ¿Tienes pensamientos perturbadores que no puedes quitarte de la cabeza?
- ¿Te sientes como si estuvieras “fuera de control” o “enloquecieras”?
- ¿Sientes que nunca deberías haber sido padre o madre?
- ¿Te preocupa que puedas hacer daño a tu bebé o a ti mismo/a?

Cualquiera de estos síntomas, y muchos más, podrían significar que padeces un trastorno mental perinatal.

La buena noticia es que puedes recibir tratamientos que te ayudarán a volver a sentirte tú misma/o. **No hay razón para seguir sufriendo.**



Para más información, visita postpartum.net/en-espanol.



Programas de PSI

PSI ofrece una gran cantidad de recursos para una amplia gama de necesidades, situaciones y públicos. Nuestros programas clave para personas y familias afectadas incluyen:

- > **Línea de ayuda de PSI**, un número de teléfono gratuito 1-800-944-4773 al que cualquiera puede llamar para obtener información básica, apoyo y recursos. También está disponible el apoyo por mensaje de texto en el 800-944-4773 y en el 971-203-7773 (Español).
- > **Grupos de apoyo y programa de pares**, diferentes opciones de temas para grupos de apoyo en línea, disponibles cinco días a la semana y un programa de apoyo de pares que empareja a personas necesitadas con un voluntario formado que también ha experimentado y se ha recuperado totalmente de un trastorno de salud mental perinatal.
- > **Chatea con un experto**, facilitadas por profesionales licenciados en salud mental, estas sesiones proporcionan una oportunidad de buscar información general sobre los trastornos SMP de un experto/a de PSI.
- > **Directorio de proveedores en línea** (psidirectory.com/spanish) que ayuda a las personas y a las familias a conectarse rápida y fácilmente con proveedores de salud mental perinatal cualificados en su zona.
- > **The Climb**, un evento comunitario internacional que reúne a supervivientes, proveedores y simpatizantes en el mayor evento mundial de sensibilización y recaudación de fondos.
- > **The Blue Dot Project** tiene como objetivo reducir el estigma y la vergüenza en torno a PMH creando conciencia y promoviendo el punto azul como símbolo de supervivencia, apoyo y solidaridad.

También puedes encontrar apoyo, conocer más sobre nuestros programas y participar en postpartum.net/en-espanol.

8.2025

Madres y padres



Podemos ayudarle con la salud mental perinatal

Se supone que tener un bebé es una experiencia increíble, el mejor momento de tu vida. Todo el mundo dice: “¡Debes estar tan feliz!”

Pero, ¿y si no es así?
¿Y si estás atravesando momentos de depresión, ansiedad o agobio?
¿Y si tu pareja o tus amigos están preocupados por ti, pero no sabes cómo hablar de ello?

No estás sola/o. Postpartum Support International puede ayudarte a mejorar.



Llama a la Línea de Ayuda de PSI al 1-800-944-4773 (inglés y español) o visita postpartum.net/en-espanol

Envía un mensaje de texto “Help” al 800-944-4773 para ayuda en inglés. Manda un mensaje al 971-203-7773 por ayuda en español.

Síguenos en **Instagram** y **Facebook**: @PSIespanol
Descarga Connect by PSI en tu tienda de aplicaciones.

Los servicios de PSI son gratis y confidenciales.



Muchas personas se enfrentan a problemas de salud mental durante el periodo perinatal: el embarazo, la pérdida y los 12 meses posteriores al parto. De hecho, los trastornos mentales perinatales son la complicación más frecuente de la maternidad en Estados Unidos.

Aunque la mayoría de la gente está familiarizada con la depresión posparto, existen otras formas de trastornos de este tipo, como la ansiedad, el trastorno obsesivo-compulsivo, el trastorno de estrés postraumático, el trastorno bipolar y la psicosis. Pueden afectar a padres de todas las culturas, edades, ingresos y razas. *Consulte el siguiente panel para obtener una lista completa de los trastornos PMH.*

Si no se tratan, los trastornos del PMH pueden provocar nacimientos prematuros o con bajo peso, alteraciones del vínculo afectivo entre padres e hijos y problemas de aprendizaje y comportamiento en la infancia. Incluso pueden aumentar el riesgo de mortalidad materna. La buena noticia es que se dispone de apoyo y recursos que pueden ayudar a prevenir estas complicaciones.

1 EN 5

mujeres y 1 de cada 10 hombres experimentan depresión o ansiedad durante el periodo perinatal.

PSI puede ayudar

Postpartum Support International (PSI) puede ponerte en contacto con el apoyo y la ayuda que necesitas. Ya sea simplemente hablando con otras personas que han estado donde tú estás o encontrando un profesional que pueda proporcionarte tratamiento, PSI está ahí para ti. Durante más de 35 años, hemos proporcionado recursos y programas para ayudar a dar a las nuevas familias el comienzo más sólido y saludable posible.

Obtenga más información sobre los trastornos PMH en Postpartum.net/en-espanol/conozca-los-sintomas/



Trastornos de Salud Mental Perinatal

El periodo perinatal incluye el embarazo, el posparto y los 12 meses posteriores al parto.

¡ES IMPORTANTE
recibir el apoyo y cuidado que necesitas!

Trastornos de SMP

- **Depresión Perinatal**
Los síntomas pueden incluir sentimientos de ira, tristeza, irritabilidad, culpabilidad, falta de interés por tu bebé, cambios en los hábitos alimentarios y de sueño, problemas de concentración, desesperanza y, a veces, incluso pensamientos de hacer daño a tu bebé o a ti misma/o.
- **Ansiedad Perinatal**
Los síntomas pueden incluir preocupaciones y miedos extremos, a menudo por la salud y la seguridad de tu bebé. Algunas personas tienen ataques de pánico, que pueden incluir dificultad para respirar, dolor en el pecho, mareos, entumecimiento y hormigueo, y sensación de perder el control.
- **Trastorno Obsesivo Compulsivo Perinatal**
Los síntomas pueden incluir pensamientos o imágenes mentales repetitivos, perturbadores y pensamientos o imágenes mentales no deseados (obsesiones), y/o la necesidad de evitar ciertos desencadenantes de manera repetitiva (compulsiones).
- **Trastorno de Estrés Postraumático Posparto**
A menudo se debe a un parto traumático o aterrador, o a un trauma pasado. Los síntomas pueden incluir recuerdos del trauma con sentimientos de ansiedad y la necesidad de evitar cosas relacionadas con ese acontecimiento.
- **Trastornos Bipolares del Estado de Ánimo**
A muchas personas se les diagnostica por primera vez depresión o manía bipolar durante el embarazo o después. Un trastorno bipolar del estado de ánimo puede manifestarse como una depresión grave.
- **Psicosis Perinatal**
Los síntomas pueden incluir la incapacidad para dormir, ver imágenes o escuchar voces que los demás no pueden. Puedes creer cosas que no son ciertas y desconfiar de quienes te rodean o tener periodos de confusión, manía, depresión o pérdida de memoria. Esta enfermedad es poco frecuente pero peligrosa, por lo que es importante buscar ayuda profesional inmediatamente.